

# Корвалол

## Форма выпуска

Капли для приема внутрь

## Описание

Прозрачная бесцветная жидкость со специфическим запахом.

## Состав на 1 л:

активные вещества: этилбромизовалерианат – 20,00 г, фенобарбитал – 18,26 г, мяты перечной листьев масло – 1,42 г, вспомогательные вещества: натрия гидроксид – 3,15 г, спирт этиловый 95% – 580 мл, вода очищенная – 420 мл.

## Упаковка

Флакон 25 мл.

## Фармакотерапевтическая группа

Седативное средство.

## Фармакологическое действие

Комбинированный препарат. Фенобарбитал обладает седативным и мягким снотворным эффектами. Способствует снижению возбуждения центральной нервной системы и облегчает наступление естественного сна. Этилбромизовалерианат оказывает седативное и спазмолитическое действие. Мяты перечной листьев масло обладает рефлекторной сосудорасширяющей и спазмолитической активностью.

## Показания

Корвалол назначают в качестве седативного и сосудорасширяющего средства при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы (в т.ч. тахикардии), бессоннице, невротоподобных состояниях, сопровождающихся повышенной раздражительностью, состоянии возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями. В качестве спазмолитического лекарственного средства – при спазмах кишечника.

## Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; тяжелая почечная/печеночная недостаточность, период лактации, беременность, детский возраст (до 3 лет). Алкоголизм, черепно-мозговая травма или заболевания головного мозга (в связи содержанием этанола).  
*С осторожностью:* Детский возраст старше 3 лет.

## Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Назначение препарата в период беременности противопоказано.

### **Способ применения и дозы**

Доза и длительность применения устанавливается индивидуально.

Внутрь, перед приемом пищи, предварительно растворив в небольшом количестве (30-50 мл) воды.

Разовая доза у взрослых 15-30 капель, при необходимости (например, при выраженной тахикардии) разовая доза максимально может быть увеличена до 40-50 капель. Кратность приема – 2-3 раза в сутки.

Детям с 3 лет на один прием – по 1 капле на год жизни ребенка в сутки. Необходимость применения повторной дозы определяется врачом в зависимости от клинической картины заболевания.

### **Меры предосторожности при применении**

Препарат содержит 58 объемных процентов этанола и фенобарбитал, поэтому в период лечения необходимо воздерживаться от управления транспортными средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При длительном применении препарата возможно формирование лекарственной зависимости; возможно накопление брома в организме и развитие явлений бромизма.

### **Побочные действия**

Сонливость, головокружение, замедление сердечного ритма, снижение способности к концентрации внимания, аллергические реакции.

### **Передозировка**

Симптомы: угнетение центральной нервной системы, нистагм, атаксия, снижение артериального давления, возбуждение, хроническая интоксикация бромом (депрессия, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушения координации движений).  
Лечение: симптоматическое, при угнетении центральной нервной системы – кофеин, никетамид.

### **Лекарственное взаимодействие**

Лекарственные средства, угнетающие центральную нервную систему, усиливают действие корвалола. Фенобарбитал (индуктор микросомального окисления) может снижать эффективность лекарственных средств, метаболизирующихся в печени (в т.ч. производные кумарина, гризеофульвина, глюкокортикостероидов, пероральных контрацептивов); усиливает действие местноанестезирующих, анальгезирующих и снотворных лекарственных средств.

### **Условия хранения**

В защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 10 °С до 25 °С.

### **Срок годности**

2 года.