

Натрия тетраборат (Бура в глицерине)

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения 20 %

Описание

Бесцветная вязкая жидкость.

Состав

действующее вещество: натрия тетрабората

декагидрат – 20 г;

вспомогательное вещество: глицерол (глицерин) – 80 г.

Упаковка

Флакон 30 г.

Фармакологическое действие

Натрия тетраборат - антисептическое средство.

Обладает бактериостатической активностью.

Эффективен при кандидозе.

Удаляет мицелий гриба со слизистых оболочек, нарушает процесс прикрепления гриба к слизистым оболочкам и тормозит его размножение. Антисептическое средство. Обладает бактериостатической активностью. Эффективен при кандидозе. Удаляет мицелий гриба со слизистых оболочек, нарушает процесс прикрепления гриба к слизистым оболочкам и тормозит его размножение (не является противогрибковым препаратом, т.к. не обладает фунгицидным или фунгистатическим действием). Обладает инсектицидными свойствами.

Показания

Кандидозные поражения слизистой оболочки полости рта, глотки, верхних дыхательных путей, мочевыводящих путей и половых органов; опрелости, пролежни.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст до 3-х лет. Нарушение целостности кожных покровов (при обработке кожи).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

Местно и наружно. Возрастная категория пациентов: взрослые, дети с 3-х лет.

Используют для полосканий, смазывания кожи, спринцеваний 2-3 раза в день. Лечение осуществляют по мере необходимости, до устранения симптомов заболевания.



Побочные действия

Гиперемия, ощущение жжения в месте нанесения препарата, аллергические реакции.

Передозировка

Передозировка при местном применении. Симптомы передозировки при местном применении препарата маловероятны. Сведения о случаях передозировки при местном применении отсутствуют.

Передозировка при случайном приеме препарата внутрь. Летальная доза для взрослых – 10-20 г, токсическая концентрация в крови – 40 мг/л, летальная концентрация – 50 мг/л. Возможны следующие симптомы: боль в животе, рвота, снижение аппетита, диарея, дегидратация, слабость, спутанность сознания, дерматиты, нарушения менструального цикла, анемия, подергивание мышц лица и конечностей, алопеция, нарушение функции сердца, печени и почек. Лечение передозировки при приеме препарата внутрь включает: промывание желудка, форсированный диурез, при тяжелом отравлении - гемодиализ, в/м - рибофлавин-мононуклеотид 10 мг/сут, коррекция водно-электролитного баланса и ацидоза: в/в инфузия раствора натрия гидрокарбоната, плазмозамещающие растворы, раствор натрия хлорида и декстрозы. При болях в животе - п/к 1 мл 0.1% раствора атропина, 1 мл 0.2% раствора платифиллина, 1 мл 1% раствора промедола, в/в - декстрозо- прокаиновая смесь (50 мл 2% раствора прокаина и 500 мл 5% раствора декстрозы). Поддержание функций сердечно-сосудистой системы.

Особые указания

При монотерапии вагинального кандидоза с целью повышения эффективности необходимо, чтобы лечебные процедуры проводились медицинским персоналом многократно, в противном случае мицелий гриба может задерживаться в криптах слизистой оболочки влагалища, что приводит к рецидиву заболевания.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.