

## Сироп солодки

### Форма выпуска

Сироп

### Состав

*действующее вещество:* солодкового корня экстракт густой – 4 г;

*вспомогательные вещества:* сахарный сироп (сахароза, вода) – 86 г; этанол (этиловый спирт) 95 % – 8,7 г; вода очищенная – до 100 г.

### Упаковка

Флакон 100 мл.

### Фармакологическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

### Фармакологическое действие

Оказывает отхаркивающее действие, обусловленное, в первую очередь, наличием глицирризина, усиливающего секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей.

### Показания к применению

Применяют у взрослых и детей в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, главным образом, при наличии плохо отделяемого, густого и вязкого секрета (особенно у детей и лиц пожилого возраста).

### Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, бронхиальная астма, гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

*С осторожностью:* заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, сахарный диабет, детский возраст.

### Способ применения и дозы

Внутри взрослым по 1 чайной ложке, предварительно разведенной в  $\frac{1}{2}$  стакана воды, 3 раза в день;

детям до 2 лет – по 1-2 капли (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день;

детям с 2 до 6 лет – по 2-10 капель (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день;



детям с 6 до 12 лет – по 50 капель (предварительно разведенных в  $\frac{1}{2}$  стакана воды) 3 раза в день;

детям старше 12 лет – по 1 чайной ложке (предварительно разведенной в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день;

Курс лечения 7-10 дней. Целесообразность проведения повторного курса лечения определяется врачом. При наличии плохо отделяемой мокроты и для облегчения отхаркивания рекомендуется обильное теплое питье.

### **Побочные действия**

Возможны аллергические реакции; в отдельных случаях могут наблюдаться диспепсические явления (диарея). При длительном применении возможны гипокалиемия, повышение артериального давления, появление периферических отеков вследствие нарушения водно-электролитного обмена.

### **Передозировка**

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение: симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Препарат можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний. Не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

### **Меры предосторожности**

Информация для больных сахарным диабетом: в 1 чайной ложке препарата содержится 0,11 хлебных единиц (ХЕ), в 1 капле - 0,01 ХЕ.

Максимальная разовая доза препарата для взрослых содержит 0,43 г абсолютного спирта, максимальная суточная доза – 1,4 г абсолютного спирта, в 1 капле (для детей) – 0,019 г абсолютного спирта.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора, и т.п.).

### **Условия хранения**

При температуре не выше 20 °С, в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.