

Винилин

Форма выпуска

Бальзам.

Описание

Густая вязкая жидкость светло-желтого цвета, специфического запаха. На воздухе не густеет и не высыхает.

Состав

действующее вещество: поливинокс (винилин) – 50 г или 100 г.

Упаковка

Флакон 50 г, 100 г.

Фармакологическое действие

Оказывает антисептическое действие, способствует очищению ран, регенерации тканей и эпителизации. При приеме внутрь действует как обволакивающее, противовоспалительное и бактериостатическое средство.

Показания к применению

Наружно: фурункулы, карбункулы, трофические язвы, гнойные раны, мастит, ранения мягких тканей, ожоги и обморожения.

Внутри: в комплексном лечении эрозивно-язвенных заболеваний желудка и 12-перстной кишки, обострение хронических гастритов с повышенной секреторной функцией желудка.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к поливиноксу, заболевания печени, желчного пузыря и почек, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период кормления грудью

Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно: для смачивания салфеток и непосредственного нанесения на раневую поверхность в достаточном количестве 2-3 раза в день. Курс лечения от 5 до 18 дней в зависимости от тяжести заболевания.

Внутри: 1 раз в день через 5-6 ч после последнего приема пищи (рекомендуется легкий ужин в 18 ч и прием препарата в 23-24 ч);

- при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки – 1 чайная ложка в первый день, в последующие дни – по 1 десертной ложке; курс – 16-20 дней;
- при гастритах с повышенной секреторной функцией и выраженной изжоге – в первый день – 1 чайную ложку, далее – по 1 десертной ложке через день, курс – в течение 10-12 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Условия хранения

В хорошо укупоренной таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на этикетке.