

Каметон

Форма выпуска

Спрей для местного применения

Описание

Маслянистая жидкость со специфическим запахом в стеклянных флаконах с распылительной насадкой.

Состав

1 баллон (флакон) 30 г содержит:

активные вещества: хлорбутанол 0,3 г, камфора 0,3 г, левоментол 0,3 г, эвкалипта прутовидного листьев масло 0,3 г;

вспомогательные вещества: пропиленгликоль 23 г, вода очищенная 5,8 г.

Упаковка

Флакон 30 г.

Фармакологическое действие

Каметон комбинированный препарат для местного применения, действие которого определяется входящими в его состав компонентами. Оказывает местное противовоспалительное, антисептическое и умеренное местноанестезирующее действие. *Хлорбутанол* оказывает умеренное местноанестезирующее, противовоспалительное и антисептическое действие. *Камфора* оказывает раздражающее и отчасти антисептическое действие, усиливает кровоток в месте нанесения. *Левоментол* оказывает местноанестезирующее действие, сопровождающееся ощущением холода. Раздражающий (отвлекающий) эффект способствует устранению болевых ощущений. Обладает также слабым антисептическим свойством. *Эвкалиптовое масло* оказывает стимулирующее влияние на рецепторы слизистых оболочек, обладает также слабой местной противовоспалительной и антисептической активностью. Сочетание указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

Показания к применению

Комбинированная терапия инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов (тонзиллит, фарингит, ларингит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, детский возраст (до 5 лет).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Достаточного опыта применения препарата при беременности и в период грудного вскармливания нет. При необходимости применения препарата при беременности следует оценивать пользу для матери и возможный потенциальный риск для плода. Применение препарата в период грудного вскармливания возможно в связи с низкой системной абсорбцией компонентов, входящих в состав препарата Каметон.

Способ применения и дозы

Препарат применяется местно. Перед применением с распылителя снимают защитный колпачок (при наличии). При применении баллон (флакон) следует держать вертикально, чтобы распылитель находился вверху; нельзя пользоваться баллоном (флаконом) в перевернутом состоянии. После применения препарата на распылитель следует надеть защитный колпачок.

При терапии воспалительных заболеваний глотки и гортани (фарингит, ларингит, тонзиллит) распылительную насадку вводят в полость рта. Препарат следует применять после еды, предварительно прополоскав полость рта теплой кипяченой водой. Распыление препарата в этом случае проводят независимо от фазы «вдоха» или «выдоха». За одно применение у взрослых осуществляют по 2-4 распыления вправо и влево, у детей в возрасте от 5 до 12 лет по 1 распылению, у детей в возрасте от 12 до 15 лет - по 1-2 распыления. Длительность нажатия на распылитель 1-2 сек. Частота применения – 3-4 раза в сутки. Курс лечения – 7-10 дней.

Если после курса лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочные действия

Аллергические реакции в виде кожной сыпи, которые проходят самостоятельно после отмены препарата. При применении препарата возможны ощущения легкого жжения и покалывания.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, связанные с заглатыванием части препарата.

Лечение: проводится симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Совместим с другими лекарственными средствами, данные о клинически значимых взаимодействиях отсутствуют.

Особые указания

Применение препарата Каметон у детей старше 5 лет возможно только по рекомендации врача!

При распылении в носовой полости не запрокидывать голову и не переворачивать баллон (флакон) вверх дном. Не рекомендуется пользоваться одним и тем же баллоном (флаконом) нескольким пациентам во избежание распространения инфекции. Во время распыления препарата следует избегать его попадания в глаза.

Условия хранения

В сухом месте при температуре от 15 до 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.