

# Пертуссин сироп

## Форма выпуска

Сироп

## Состав

100 г сиропа содержат:

*Активные вещества:* чабреца экстракт жидкий

12 г, калия бромид 1 г;

*Вспомогательные вещества:* сахарозы раствор

64 % (сахарный сироп), этанол (этиловый спирт)

95 %, вода очищенная.

## Упаковка

Флакон 100 мл.

## Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство.

## Фармакологическое действие

Комбинированный препарат. Экстракт травы чабреца оказывает отхаркивающее действие, увеличивает количество секреторного отделяемого слизистых оболочек верхних дыхательных путей, способствует разжижению мокроты и ускорению ее эвакуации. Калия бромид снижает возбудимость центральной нервной системы.

## Показания

Применяют как отхаркивающее и смягчающее кашель средство при бронхитах и других заболеваниях верхних дыхательных путей. Назначают также детям при коклюше.

## Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия, хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), беременность, период лактации, детский возраст (до 3 лет). **С осторожностью:** сахарный диабет; детский возраст старше 3 лет (в связи с наличием этанола в препарате).

## Способ применения и дозы

Препарат принимается внутрь, после еды (в связи с возможностью снижения аппетита).

Взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день;

детям от 3 до 6 лет – по  $\frac{1}{2}$  чайной ложки 3 раза в день;

детям от 6 до 12 лет – по 1-2 чайной ложке 3 раза в день;

детям старше 12 лет – по 1 десертной ложке 3 раза в день.



Курс лечения 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

### **Побочные действия**

Возможны аллергические реакции, изжога.

### **Передозировка**

В случае передозировки препарата возможна тошнота. Лечение: симптоматическое.

### **Особые указания**

Сироп Пертуссин содержит сахар, что необходимо учитывать пациентам с сопутствующим сахарным диабетом.

Препарат содержит 8-11 % этанола. Содержание абсолютного спирта составляет: в 1 чайной ложке (5 мл) – до 0,43 г, в 1 десертной ложке (10 мл) – до 0,87 г, в 1 столовой ложке (15 мл) – до 1,3 г. В максимальной суточной дозе препарата для взрослых – 3 столовые ложки (45 мл) – содержится до 3,9 г абсолютного спирта.

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Указание для больных сахарным диабетом: содержание сахарозы в 1 чайной ложке (5 мл) препарата соответствует примерно 0,22 ХЕ, в 1 десертной ложке (10 мл) – примерно 0,44 ХЕ; в 1 столовой ложке – примерно 0,66 ХЕ.

### **Лекарственное взаимодействие**

Пертуссин нельзя принимать одновременно с противокашлевыми препаратами, так как они будут затруднять выведение разжиженной мокроты. К таким средствам относятся Стоптуссин, Синекод, Коделак, Терпинкод и Либексин, которые чаще всего назначаются при сухом кашле.

Одновременное применение этих препаратов с Пертуссином приведет к застою мокроты в бронхах и размножению в ней болезнетворных микробов с последующим обострением воспалительного процесса. В некоторых ситуациях, однако, врач назначает комбинированное лечение этими препаратами. В дневное время больной должен принимать отхаркивающие средства, а вечером – противокашлевый препарат, чтобы ночь прошла спокойно, без навязчивых приступов кашля.

### **Условия хранения**

В сухом месте при температуре от 2 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

4 года.